

TAXA DE INTERNAÇÃO POR TENTATIVA DE SUICÍDIO E LESÕES AUTOPROVOCADAS

Conceituação:	Taxa de internação hospitalar por tentativa de suicídio e lesões autoprovocadas, por 100 mil habitantes, em determinado espaço geográfico, no ano considerado
Objetivos, usos e interpretação:	1) Avaliar as tendências das taxas de internação por lesões autoprovocadas e tentativas de suicídio; 2) Avaliar as diferenças geográficas, bem como diferenças por sexo e idade nas taxas de internação por lesões autoprovocadas e tentativas de suicídio
Limitações:	No sentido de manter a comparabilidade com o indicador de mortalidade, foram mantidos os códigos da CID-10 utilizados no cálculo da mesma. Por esse motivo, as taxas podem estar subestimadas visto que não incluem lesões com intenção indeterminada ² As taxas representam o total de internações, incluindo reinternações do mesmo indivíduo
Fontes:	SIH-SUS e IBGE
Método de cálculo:	Numerador: número de internações por lesões autoprovocadas/tentativas de suicídio (CID-10 códigos: X60-X64.9, X66 - X84.9) + sequelas de lesões autoprovocadas (CID-10: Y87.0) ¹ Denominador: população total. As taxas de mortalidade ajustadas utilizam o método direto
Desagregação:	Macrorregião, UF, sexo, faixa etária
Material complementar:	¹ As definições de CID utilizadas pela WHO vem do GBD, estão consolidadas em - https://www.who.int/docs/default-source/gho-documents/global-health-estimates/gh2019_cod_methods.pdf ² AldridgeRW, MenezesD, LewerD, CornesM, EvansH, BlackburnRM, et al. Causes of death among homeless people: a population-based cross-sectional study of linked hospitalisation and mortality data in England. Wellcome Open Res2019;4:49. 10.12688/wellcomeopenres.15151.1