

## TAXA DE INTERNAÇÃO POR USO DE ÁLCOOL

Conceituação:	<p>Taxa de internação hospitalar devido a problemas relacionados ao uso de álcool, por 100 mil habitantes, em determinado espaço geográfico, no ano considerado.</p> <p>As doenças relacionadas ao álcool selecionadas foram definidas pela lista de causas da Organização Mundial da Saúde no Global Health Estimates: 1) transtornos relacionados ao uso de álcool, 2) cirrose hepática devido ao uso de álcool e 3) câncer de fígado devido ao uso de álcool - conforme o indicador da PAHO</p>
Objetivos, usos e interpretação:	<p>1) Avaliar as tendências das taxas de internação devido a problemas relacionados ao uso de álcool;</p> <p>2) Avaliar as diferenças geográficas, bem como diferenças por sexo e idade nas taxas de internação por devido a problemas relacionados ao uso de álcool.</p>
Limitações:	<p>Não indica a taxa de internações total relacionada ao uso de álcool por não considerar as frações atribuíveis ao uso de álcool de outros agravos - vide Alcohol-attributable fractions (who.int)</p>
Fontes:	SIH e IBGE
Método de cálculo:	
Numerador:	internações por F10 (Transtornos relacionados ao uso de álcool) + G72.1 (Miopatia alcoólica)+ Q86.0 (Síndrome alcoólica fetal)+ X45 (Envenenamento (intoxicação) acidental por e exposição ao álcool ) + K70 (Doença alcoólica do fígado).
Denominador:	população x 100.000
Categorias sugeridas para análise:	Macrorregião, UF, sexo, faixa etária
Material complementar:	<p>Pan American Health Organization. The burden of selected alcohol-related diseases in the Region of the Americas, 2000-2019. Pan American Health Organization. Washington DC, 2021 - The Burden of Selected Alcohol Related Diseases - PAHO/WHO   Pan American Health Organization</p> <p>WHO methods and data sources for country-level causes of death 2000-2019- GHE -ghe2019_cod_methods.pdf (who.int).</p>